

# Protokoll über die klinische Untersuchung eines Fohlens für die Auktion



HANNOVERANER  
VERBAND

Aussteller/in: \_\_\_\_\_

Kat.Nr: \_\_\_\_\_ Kat.Name: \_\_\_\_\_ geb.: \_\_\_\_\_

LNr. DE /Chip \_\_\_\_\_ Farbe/Geschlecht: \_\_\_\_\_

Abstammung: \_\_\_\_\_

## Allgemeine und spez. Untersuchungen:

Haut und Haarkleid,  
Pflegezustand, Körpertemperatur  o.b.B. Bsh.: \_\_\_\_\_

Pilzbefall / Narben  Nein  Ja \_\_\_\_\_

Hufe  o.b.B. Bsh.: \_\_\_\_\_

Bewegungsapparat  o.b.B. Bsh.: \_\_\_\_\_

Lahmheiten / Bewegungsstörungen  Nein Bsh.: \_\_\_\_\_

Augen  o.b.B. Bsh.: \_\_\_\_\_

Nase / Lymphknoten  o.b.B. Bsh.: \_\_\_\_\_

Husten auslösbar?  Nein  Ja \_\_\_\_\_

Vordere Maulhöhle / Zähne  o.b.B. Bsh.: \_\_\_\_\_

Überbiss  Nein  Ja \_\_\_\_\_

Herzbefunde (Auskultation)  o.b.B. Bsh.: \_\_\_\_\_

Lungenbefunde (Auskultation)  o.b.B. Bsh.: \_\_\_\_\_

Nabel  o.b.B. Bsh.: \_\_\_\_\_

Vorerkrankungen  Nein  Ja \_\_\_\_\_

## bei Hengstfohlen:

Hoden \*  o.b.B. Bsh.: \_\_\_\_\_

Beide Hoden tastbar \*  Nein  Ja \_\_\_\_\_

Beide Hoden i.d. Hodensack abgest. \*  Nein  Ja \_\_\_\_\_

Auffälligkeiten nach Sedation  Nein  Ja \_\_\_\_\_

Nachuntersuchung erforderlich  Nein  Ja \_\_\_\_\_

\* Von einem nicht reversiblen Abstieg der Hoden aus der Bauchhöhle kann erst ab einem Alter von 6 Monaten ausgegangen werden. Ein Zurückziehen in den Leistenkanal ist auch später noch möglich. Daher werden Kontrolluntersuchungen in regelmäßig Abständen empfohlen.

Bemerkungen \_\_\_\_\_

\*o.b.B. = ohne besonderen Befund

Bsh. = Besonderheiten

Ort d. Untersuchung: \_\_\_\_\_ Datum d. Untersuchung: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stempel/Tierarzt

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/Tierarzt

# Recording of the clinical investigation foals for the inspection

exhibitor: \_\_\_\_\_

Cat.No.: \_\_\_\_\_ Cat.name: \_\_\_\_\_ born: \_\_\_\_\_

ULEN: \_\_\_\_\_ Color/Sex: \_\_\_\_\_

of: \_\_\_\_\_

## generell and special investigation:

skin, coat, body temperature, behavior  normal part.: \_\_\_\_\_

scars/fungal infection  No  Yes \_\_\_\_\_

hoofs  normal part.: \_\_\_\_\_

locomotor system  normal part.: \_\_\_\_\_

lameness/movement disorder  No part.: \_\_\_\_\_

eyes  normal part.: \_\_\_\_\_

nose/lymph nodes  normal part.: \_\_\_\_\_

Coughing  No  Yes \_\_\_\_\_

Anterior mouth / teeth  normal part.: \_\_\_\_\_

overbite  No  Yes \_\_\_\_\_

heart (auscultation)  normal part.: \_\_\_\_\_

lung (auscultation)  normal part.: \_\_\_\_\_

umbilicus  normal part.: \_\_\_\_\_

medical history  No  Yes \_\_\_\_\_

## for colts:

testicles \*  normal part.: \_\_\_\_\_

both testicles palpable \*  No  Yes \_\_\_\_\_

both testicles were descended \*  No  Yes \_\_\_\_\_

findings after sedation  No  Yes \_\_\_\_\_

Follow-up examination required  No  Yes

\* Non-reversible descent of the testicles from the abdominal cavity can only be assumed from the age of 6 months. Retraction into the inguinal canal is still possible later. Regular check-ups are therefore recommended.

comments \_\_\_\_\_

\*normal = without any pathologic findings

part. = particularitis

place of the investigation: \_\_\_\_\_ date of the investigation: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
stamp/Vet

\_\_\_\_\_  
signature/Vet